

# Vacina contra o Vírus Varicela Zoster

Previne doença que causa varicela.

## VACINAS DISPONÍVEIS

Varivax® (PVP aproximado 48,27€ por dose);  
Varilrix® (PVP aproximado 41,99€ por dose).

## ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.  
A partir dos 12 meses de idade.

## EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Locais (dor, eritema, edema); Rash local ou generalizado; Herpes zoster

## CONTRA-INDICAÇÕES

Reação anafilática prévia; Imunossupressão;  
Grávidas; crianças < 1 ano; Terapêutica crónica com salicilatos; Tuberculose ativa não tratada.

# Vacina contra o Vírus da Hepatite A

Previne doença que causa hepatite A.

## VACINAS DISPONÍVEIS

Havrix® (PVP aproximado: 17,71€ por dose);  
VAQTA® (PVP aproximado: 16,98€ por dose)  
Epaxal® (PVP aproximado: 20,79€ por dose).

## ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.  
A partir dos 12 meses de idade.

## EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Locais (dor, eritema, edema); Queixas sistémicas (febre baixa, fadiga).

## CONTRA-INDICAÇÕES

Reação anafilática prévia; nas grávidas ponderar risco/benefício.

Subárea	Gestão da Saúde
Dimensão	Saúde Infantil e Juvenil

## USF ALPHA

### ACeS Baixo Vouga

Telefone: 256590060 (Válega)

Telefone: 256890406 (São Vicente Pereira de Jusã)

Email: [usf.alpha@arscentro.min-saude.pt](mailto:usf.alpha@arscentro.min-saude.pt)

Site: [WWW.USFALPHA.com](http://WWW.USFALPHA.com)

Elaborado por	Diana Silva		
Aprovado em	CG a 27/09/2019		
Versão	1	Ano de revisão	2021

## Vacinas extra

## Programa Nacional de Vacinação



## Vacina contra o Rotavírus

Previne doença que causa gastroenterite aguda.

### VACINAS DISPONÍVEIS

RotaTeq® (4 estirpes; 3 doses; PVP aprox.: 51,18€ por dose); Rotarix® (2 estirpes; e doses; PVP aprox.: 57,02€ por dose).

### ADMINISTRAÇÃO

Oral.

Até aos 6 meses de vida.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Vômitos; Diarreia; Irritabilidade; Febre

### CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade a algum componente da vacina

Alergia ao látex (na Rotarix®).



## Vacina contra Neisseria Meningitidis Serogrupo B

Previne doença que causa doença invasiva meningocócica (DIM) e/ou sepsis (infecção generalizada).

### VACINAS DISPONÍVEIS

Bexsero® (PVP aproximado: 95,09€ por dose)

Trumemba® (A partir dos 10 anos; PVP aprox.: 90,09€ por dose)

### ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

A partir dos 2 meses de idade.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Perda de apetite, sonolência, choro involuntário, diarreia, vômitos, erupção cutânea, febre e irritabilidade, bem como sensibilidade, tumefação, induração e vermelhidão da pele no local de injeção.

### CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade a algum componente da vacina; Vacinas contra pneumococo serotipo 6B, vírus polio inativado tipo 2 e pertactina.

## Vacina contra Neisseria meningitidis dos serogrupos A, C, W-135 e Y

Previne doença que causa doença invasiva meningocócica (DIM) e/ou sepsis (infecção generalizada).

### VACINAS DISPONÍVEIS

Nimenrix® (PVP aproximado: 45,71€ por dose)

Menveo® (A partir dos 2 anos; PVP aprox.: 53,26€ dose única)

### ADMINISTRAÇÃO

Por injeção intramuscular.

A partir das 6 semanas de idade.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS MAIS FREQUENTES

Perda de apetite, irritabilidade, sonolência, diarreia, vômitos, febre, tumefação, dor e vermelhidão da pele no local de injeção.

### CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade a algum componente da vacina.

